外證醫案彙編

同郡余君聽鴻以軒岐之術世其家從父諱成椿有聲道咸間郎世所稱麓泉先生者也今陽羨士大夫猶能言之君既嗣其緒復執贄於費蘭泉藝益精會兵燹家中落寂

平復旺故業僑居孟河孟河
故多良醫有聲振寰區為
名公鉅卿所倒屣者有一時喧
赫舳艫銜接數十里者咸未嘗
以君幼忽之光緒初君來游
於虞始以旋診試其術不數

載而道大行東北城鄉居民尤崇信之辰午求診扶老挈穉履閾為之穿以顧君自視欿然虛衷孜問績學靡倦於書無所不讀心領神會盡瞭其理尤樂表彰前哲雖片楮隻

孚零珠碎玉必搜求掇拾擇其精粹加以詮釋棃版行世　先大夫悟繙其數學謨受為近時不多覯注歲有傷寡論翼之刻　先大夫既釐訂其例而為之序乃剞劂未竟而　先大夫不

孫芾克見其成也今茲復輯
外科醫案彙論四卷將殺青
乃以善謚余因僕與于兩世交矣
辱
先公不棄得儕孝從問賢
喉名論今已不可再而此卷實
先公之所點定且有評語在不可

以切紀乎其端以竟先志
可乎余不敏未嘗知醫恆怪醫
之為書自古迄今浩如煙海門
逕繁複奧宧深邃昔之所是
即今之所非此之所宗即彼之
所詬泛涉則靡所指歸精求則

甚有正的易而謂失之毫釐謬
以千里若奚敢以浮掠之見妄
論其得失也頗稔若既久不可
以不文辭 又惟 先大夫精究醫
理著述淵博咸未及裒輯登諸
梨棗而此實 手澤所寄吉

光片羽首護壽世感且不朽矣爰不揣固陋序其崖略如右聊表其抱守之志以答君請抑亦諗余眾庶云爾光緒甲午七月既望陽湖趙賡暘

諺云不爲良相當爲良醫良相治世良醫濟世道雖不同其功則式也陽羨 聽鴻余君挾岐黃術壬午秋仲來游虞麓子過而訪之見其人樸誠溫厚紳宦鄉民就診者慎思切問毫不異

視無諂諛驕傲之容絕時髦矜誇之習知非尋常醫傭所可擬斯真青道之士也企慕殊深友交最篤見其曩昔註青傷寒論翼弌書晰理辨疑醫家皆奉為圭臬又讀其外證醫案彙編名

家會集卓論紛披方經驗於前
人參皆徵諸實事繁博者分其
門類與妙者闡以釋詞碎玉零
金裒然成帙知其濟世之心胥
流露於字裡行間者矣式書經
陽湖　趙惠甫先生訂正加以

評註　余君雅不欲刻予力勸其梓行去秌傷寒論翼刊成已昭昭在人耳目今書索其外證醫案彙編以付手民　余君正色拒之者再曰弍再刻書形跡近於標榜豈竟欲使方家貽笑

吾等為好名者耶乎以濟世之言動其濟世之念責其濟世之功　余君慨焉允許遂出書命乎執校讐之役乎不諳醫理何敢當此但好行其德乎與　余君夙有同情　余君著書濟世

予勸其問世又贊其壽世存諸前輩流風遺澤於無涯此書弌出定必紙貴弌時不脛而走與傷寒論翼註二書註傳不朽東棃刊竣匠氏請序於予予不得不以不文辭謝責遂援筆誌緣

起於簡端旹在

光緒二十秊歲次甲午仲冬月

上濟會稽孫思巻順齋氏謹序

醫書雖衆不出二義經文本草經方爲學術規矩之宗經驗方案筆記爲靈悟變通之用二者皆並傳不朽余劣遭兵燹先人殉難屛豁多病舊業盡棄不能奮志詩書繼先人遺緒嗜喜泛涉醫集養難後餘生讀漢書藝文志醫學方技溝時尤尊重之建安時仲聖恐去古日遠學術漸歧勤求古訓

博采衆方刪繁歸簡成傷寒卒病論為万世醫方之祖運移漢祚典籍散亡晉隋六朝並唐宋諸賢維持醫學抱殘守缺畧而言之如王叔和葛稚川皇甫謐吳普徐文伯陶宏景李鐺之巢元方全元起王氷蘇恭孫思邈王燾高繼冲陳藏器成無己朱肱皆抱經濟之才以經文本艸經方傷寒各專一家萬學

好古述而不作雖有名醫經驗等方未尚以浮薄醫業輕示後學不敢自矜為獨解也宋置醫書局於編修院命儒臣較正歷朝醫書春間設科考醫太醫局程文至今在人耳目集太平聖惠方聖濟總錄嘉祐本艸等搜羅靡富為醫學大成宋前醫書賴其引徵而存其目所謂重學術不涉浮華醫之學術不衰醫

案亦不多見自後宋許叔微將經驗方案彙裒成帙名本事方金元明諸家效之著書繁雜皆將前人經驗自己治驗方案載於篇末甚至卷帙浩繁各舒己見而爲心得誇富鬬奢遂成門戶醫案漸多矣至薛立齋專刻醫案七十八卷孫一奎新都治驗三吳治驗宜興治驗周子幹醫案續刻醫

案繆仲諄之廣筆記喻嘉言之寓意艸筆記醫案雖多臨症方案未見至　國朝吳中葉天士先生傑出具天縱才無書不讀名振寰宇終身未著書雖有數種皆後人書賈僞託其名余讀唐書許胤宗傳胤宗陳隋名醫終身未著書人求其著述胤宗曰醫者意也在人思慮出而述別脈識症用藥

之難不敢著書貽誤後學天士先生亦脩宗一流人耶後錫山華岫雲輯其晚年門人所錄方案不載稱呼不誇效驗但冠姓於年掃盡諸家浮習分門別類都爲十卷名曰臨症指南醫案讀其方案審病處方詳愼簡潔不刻意於古而自饒古趣此所謂宗學術規矩參以靈悟變通隨筆所著之

書也收入四庫全書後仿其體例而刻醫案者接踵而起張氏輯葉氏遺稿合康作霖王子接為三家吳氏合薛雪繆遵義又為三家其後裔輯其遺稿四卷曰醫案存真王小林輯其遺稿兩卷曰徐批葉案真本琴川曹仁伯延陵弟子記如臯吳渭泉臨症醫案筆記丹徒王久峯曰記醫案海

甯王孟雄醫案如臯顧曉瀾吳門治驗錄余居孟河廿餘年集馬培之徵君費晉卿觀察益三馬君佩堂丁君沛三巢君日初馬君費蘭泉先生麓泉堂伯諸前輩舊方至數万頁未得梓行余見醫案雖多惟外科臨症方案未曾見也後得青浦陳學山先生外證醫案讀之審病詳慎案句簡

潔雖不能与葉氏相抗聊可武其後塵余甚愛之閒有初學外科者以成方而治新病恐寒涼溫補誤投外證未愈內證蠭起以致不可收拾內外推諉、棄而不治余寔憫之陳學山先生專於內而精於外合葉氏指南涉於外症者輯裒成帙與初學外科者開靈活之機化拘執之弊稿成乞趙惠甫鄉

丈閱之加以評語置之未行會稽順齋孫君余道義交也去秋慷慨助資刋余註傷寒論㝡今春見此稿欲余問世余曰醫之一道靈素九經文辭質奥通人尚難章句班固疾醫之以熱益熱以寒益寒醫之能辯寒熱者鮮矣滈于意自云藥方試之多不驗則十全者難矣人每問余醫理惶愧不

敢答再一刻書貽笑方家孫君索之再余笑曰史遷云君所謂高而好行其德者也未便固却倩孫君校正增删都為四卷名外證醫案彙編以付手民是書孫君贊助而成非余志也棗梨告竣索余弁言於首余恐醫案日多學術日衰浮薄之風日盛若勦襲辞句方案為行醫之捷徑華其外

而悴其內恐不足恃耳余髫年失學自愧不文爰
筆書此惟願吾道不涉浮華當重學術爲是
光緒廿年歲次甲午十二月中浣荆溪余昺和
聽鴻氏序於海雲寄舫

外證醫案彙編

凡例

一上古方書內外不分。內經有癰疽篇。金匱有瘡瘍篇。千金、外臺、四子諸家、無不講究外證。今時內外各專其科。外科專仗膏丹刀鍼、諳內症者少。內科專司脈息方藥、諳外症者不多、病家每遇大症、或兼感冒寒熱、疑外科不諳內病、延內科用藥、立方每至內外兩歧、彼此相左、當表反補、宜托反清、內症未平、外症變端蜂起、攻補錯投、溫涼悞進、貽害匪輕、茲輯方案內外兼證者多、俾司瘍科留心體會、博考內症羣書、如遇內外兼證、始終一手調治、醫者可得心應手、病者亦受益多矣、

一內經曰、東方之域。其民食魚而嗜鹹。其病皆為癰瘍。其治宜砭石。故砭石者。亦從東方來。吳中地偏東南。海濱低窪之鄉。濕卑之地。濕熱薰蒸。食魚嗜鹹。瘍症最多。茲專輯吳中名醫方案。彙集成篇。經曰。四方有異治。故他處名公佳作。一概未錄。

一此案本為內外兩科合同起見。惟青浦陳學三先生。內外皆精。聽存先生門診醫案草本、惜言外症者不多、今輯存四百六十八首、又三家醫案內輯吳門薛生白先生三首、繆宜亭先生十八首、又臨證指南醫案內輯葉天士先生二百三十七首、集成四卷、分一十三部、七十三門、以便閱者易於查核、夫外症從百會疽起、湧泉穴止、症名繁雜、聽自愧不敏、有者採之、無則棄之、

不敢私心自立一方、畫蛇添足、外症名目雖多。醫案本非全書。潛心默契。治法全神俱在。能治此。即能治彼。若刻舟守柱。豈能貫通其理。能意會於中。變通運用。決無固執之弊。黃帝曰知其要者。一言而終。不知其要者。流散無窮。故外症無者、概不標出。

一附案四十六首、吳江徐洄溪先生、於時最近。精於瘍科。採入以廣見聞、先哲瘍症醫案、刊之甚夥、薛張王諸家、卷頁浩繁、徒亂心目、况有原本可考、概不採錄、聽妄附治案數首、或見聞確實、或偶爾倖功、皆實事求是、不敢虛誇誑誕、希邀名譽、顧高明曲諒恕之、

一各部後附論、聽愧幼年失學、鄙俚無文、本不敢輕於落筆貽笑

大方、因友相勸曰、醫學與儒學稍異、不在措辭、治法頗繁、將諸經絡、挈其綱領、略為敘述、以便閱者有緒、姑不揣譾陋、摭拾成篇、皆診餘抽暇、信手拈來、從中句讀不明、字理錯誤、祈高明更正、初學之士、幸勿以句俚文淺忽之、

一此案雖云外科、方案之中、內證十有七八。如骨槽風、失禁、瘰癧、時毒、風痰、耳、目、鼻、唇、齒、舌、咽喉、乳瘍、脇肋、莖囊、痔瘡、肛漏、內癰、肺癰、胃癰、肝癰、大小腸癰、腎俞癰、肛癰、產後癰、瘍潰瘍變症、俱內外合治之症、病家求治。內外相左。病豈能愈。內外推諉。又非濟世之道。內外同診。和衷共濟。刀鍼圍貼。立方用藥。融通斟酌。盡善盡美。按日奏功。自然聲名日上。積德於後。若內外妒嫉。各

孰偏見置病家性命於腦後。倘一敗壞。謗毀蠭起。名聲日下。不但損德於己。尤為無益。若遇不起之病。二豎深入。和緩難療。雖免外人誹謗。今時總以成敗論人。不白之冤。勢所難免。決不可忿爭怨尤。徒亂心思。只要仰不愧天。俯不愧心。外言又何足恤哉。余每遇此境。輒誦瀧崗阡表所云。吏治豈不與醫治同。實無法挽回。求其生而不得。死者與我皆無恨也之言。自然心地甯。魂夢安。若從中稍有生機。或識見不到。粗心浮氣。同道妨功害能。求其生猶失之死。為醫者豈無過歟。

一昔醫以和緩得名。乃左氏寓意。醫能和緩者。即為上工。今輯之案。皆殤症和緩之方。輕可去實。醇正神奇。故外科駁雜霸道單

方。概未採入。惟願同志。皆歸醇正和平。王道緩治。雖無近功。不致一朝敗事。若不中病。悞亦不遠。余媿不知瘍科。忍瘍症與內症相同。同症險者。用方不能不峻。症雜者。用藥不能不雜。此等症百中難見一二。如內科大承氣。四逆加人參。麻黃升麻等。非常用之方。要平昔用功好學。臨症有處稽考。若胸無把握。遇重症妄施誤投。反有病輕藥重之弊。故駁雜霸道。峻劑單方。一概不錄。

一瘍科刀鍼圍貼。俱有衣鉢相傳。立方用藥。不出內科之理。臨證隨錄之方。皆臨時從心所發。錯綜變化。皆宗先哲本源。如儒家時藝。皆從先聖之書而成。醫學之內經。難經。傷寒。金匱。本草經。

即儒家六經語孟。脈經、甲乙經、即左氏公穀策語。唐、宋、金、元諸書。即兩漢、六朝、唐、宋之文。看臨證之方。如看時藝一般。將其神理體會得到古書之上。自知學有根柢。臨證取法用藥。自有左右逢源之妙。若不細心玩索。摭拾辭句。勦襲方藥。以病湊方。藉此爲行醫之捷徑。大失輯書之意。貽誤後學之罪。吾豈能辭。

一方案雖分門別類。每類之中。各症俱有兼病。或內癰而兼外感者。或外症而兼內傷者。或實症夾虛。或虛症夾實。或外證日久。而有感冒風寒。內停食滯。此外症虛。內證實也。若久病體虛。驟發癰瘍紅腫。此乃外症實。內症虛也。時令有寒煖。人體有强弱。年齒有老幼。或症同。氣血時令不同。豈能一一考覈。以此類推

一方之中自有一方之理法在焉如作文以見症為題單題截題搭題虛小題大典題全章題半節題一字兩字三章四章等題醫臨症時必有兼病能心領神會看清題情如作文平淡奇濃心隨意轉無不中窾所以臨症方案如時藝不廢之書也為醫者豈可不閱哉

一先哲存方案與後讀人者本難要讀書識症立法定方四事俱備再合人事天時虛實通融更改遂能有至妥至當之方後人讀方案者當知所立之方宗何書兼何症用何法辨其藥之性細咀其味自然醕疵立辨融會貫通用之不盡自為古人知己若妄批誤刪徐洄溪先生批葉氏案尚不能知香巖先生底蘊

何況識淺者不須言矣。

一吾友曰、所編方案、不知後人信否、不知當時效否、余曰、萬事皆不出手理。知醫理者。自然能辨。自然能信。不知醫理者不但不能辨別。信亦徒然。況青浦陳學三先生之案。筆性簡明敏捷。他人亦學不到此。有居處地名者。皆陳氏方案也。葉天士先生之方案有臨證指南可攷。薛繆二公亦有三家醫案可證。每方之下。故不註出何人手筆。讀者查對。明眼是能辨別也。

一聽本不知醫豈敢妄編此案、因人以爲外科易、每以成方而治兼病、余思陰陽虛實總歸內科一理。若肺腎陰虛者。溫熱豈可妄用。脾胃陽弱者。寒涼豈得誤投。所以編集此案而化、初學拘

執之弊。開靈活敏捷之機。與瘍症中未嘗無小補爾。

辛卯仲冬上浣荆溪余景和聽鴻氏識

瘍科論

徐大椿

瘍科之法全在外治其手法必有傳授凡辨形察色以知吉凶及先後施治皆有成法必讀書臨症二者皆到然後無誤其升降圍點去腐生肌呼膿止血膏塗洗熨等方皆必純正和平屢試屢驗者乃能應手而愈至於內服之方護心托毒化膿長肉亦有真傳非尋常經方所能奏效也惟煎方則必視其人之強弱陰陽而為加減此則必通於內科之理全在學問根柢然又與內科不同蓋煎方之道相同而其藥則有某毒主某藥某症主某方非此不效亦另有傳授焉故外科總以傳授為主徒恃學問宏博無益也有傳授則較之內科為猶易惟外科而兼內科之症或其人本有宿

病或患外症之時復感他氣或因外病動極內傷臟腑則不得不兼內科之法治之此必平日講於內科之道而通其理然後能兩全而無失若不能治其內症則并外症亦不可救此則全在學問深博矣若為外科者不能兼則當另請名理內科為之定方而為外科者參議於其間使其藥與外症無害而後斟酌施治則庶幾兩有所益若其所現內症本因外症而生如痛極而昏暈膿欲成而生寒熱毒內陷而生脹滿此則內症皆由外症而生只治其外症而內症已愈此又不必商之內科也但其道甚微其方甚衆亦非淺學所能知也故外科之道淺言之惟記煎方數首合膏藥即樂幾料已可以自名一家若深言之則經脈臟腑氣血骨脈之理

及奇病怪疾千態萬狀無不盡識其方亦無病不全其珍奇貴重難得之藥亦無所不備雖遇極奇極險之症亦了然無疑此則較之內科為更難故外科之等級高下懸殊而人之能識其高下者亦不易也

外證醫案彙編目錄

卷一

首部

項部

卷三

外部

背部

前後陰部

股腿脛足部

潰瘍

方十三首　論一首

外證醫案彙編卷一

陽湖趙能靜先生閱

陽羨余景和聽鴻甫編輯

會稽孫思恭順齋甫校刊

首部

○腦疽

常熟俞　腦疽督脈所主。現象、堅硬、而不紅、活。恐流毒於下。延至棘手。姑宜溫理托毒。以參消息。

鹿角霜　角鍼　川芎　土貝　地丁草

生黃耆　銀花　赤芍　甘草節

太倉朱　腦疽根堅平塌。藥餌化毒兼提。

生首烏　紫草茸　羌活　澤瀉　生黃耆托毒

白茄蒂　鮮筍尖　川芎　陳皮　用筍尖茄蒂提托非俗筆所能

劉河施　平素悒鬱陰分久虛腦疽陡發脈細不揚症屬陽陷陰微加以年高胃弱若欲消散須延匝月　茄蒂生首烏治對可見王履素折肱漫錄註

製附子　嫩黃耆全上　生首烏全上　甘草　遠志炭

炙殭蚕　石決明　鮮筍尖

覆方　根盤雖縮膿腐未除四圍紅暈仍恐毒邪復陷未許竟入坦途也

生黃耆托毒　黨參　枸杞子　陳皮　甘草　銀花

炙黃耆補脾　於术　皂角鍼　荷梗　黃耆生炙並用大有意味

再覆方　毒去新生納穀稍健生機有慶矣

人參補氣　金石斛清胃　銀花解毒　水炙黃耆補氣　雲苓補脾氣利小便

製首烏養血固　枸杞子補肝腎　甘草解毒

茜墩趙　腦疽五六日高腫膿泄甚屬佳兆肥人多濕濕多痰盛而氣虛故膿色白滯不榮皆由氣衰最防毒陷姑擬提托冀其膿稠納增便為鬆候

半夏麯開胃和中化痰　甘草節解毒　遠志炭補不足除邪氣　生黃耆提托　殭蠶祛風邪

生首烏清熱　川貝母消痰　皂角鍼排膿　雲苓補脾氣利小便　筍尖提托

周莊錢　腦疽平塌色暗高年氣血兩虧以致不能衝突高腫蘊毒深厚難以化腐成膿姑擬托化以冀轉敗為功

生黃蓍（提托）　生首烏（潤腸解毒）　遠志炭（補心安神益氣）　甘草（解毒）　紅花（破瘀活血）

川貝母（消痰）　白蔻殼（開胃口消皮裏之痰）　皂角鍼（排膿）　桔梗（上行佐諸藥）　筍尖（提托）

覆方　大勢已鬆。瘡頭起發。腐脫。脈大有力。大有轉機。仍以提托治之。

製首烏（長肌肉）　遠志（補心安神益氣）　甘草（解毒和中）　黨參（補脾益氣）　皂角鍼（排膿）

生黃蓍（排膿）　茯苓（補脾益氣利水滲濕）　砂仁（理胃暢）

再覆方　寢食得安。脈象和緩。新肌漸然。其痊可待矣。業請簡明　惜墨如金

用藥穩切　瘍科明筆

水炙黃蓍（補氣）　製首烏（長肌肉）　茯苓（補脾益氣）　穀芽（開胃健脾）

水炙甘草（和中）　川石斛（養胃）　黨參（補氣）　建蓮（清心理脾補中養神）

青浦孫　腦疽寒熱胸悶。痛引腮項。紅活高腫。症屬順。候與寬胸化毒治之。

半夏麯　陳皮　藿梗　厚樸　銀花

白蔻殼　枳殼　桔梗　扁豆葉

盧墟李　腦疽偏發。是膀胱濕熱上蒸。所喜掀腫作痛。皮色紅活。可期易潰易斂。擬與清解之劑。

羌活　陳皮　土貝　遠志炭　生甘草

防風　桔梗　白蔻殼　荷梗　笋尖

接服方　老年重症。天氣酷暑。客旅起居不便。歸家調攝。自易向

如姑擬接服加

生黃耆 土貝清肺 皁角鍼拔膿 白蔻殼開胃 六一散

忍冬花解毒 厚樸和胃 半夏麴開胃 殭蠶祛風 扁豆葉健脾解毒

太倉陳 腦疽愈後頸項忽起紅暈兼發水泡此係毒未盡洩法

擬清涼解毒治之

烏犀尖退火 西洋參 生甘草解毒 遠志炭 牡丹皮

天花粉排膿 川石斛養胃 鮮銀花解毒 鮮荷梗通氣清熱 二方清正

某 頸項疼痛腐爛高突四圍皆發細瘰係積熱上乘太陽濕熱

陽明濕痰互結化火姑擬清化上焦積熱 方缺

某 頭巔熱癤未能泄邪此身熱皆成膿之象辛涼兼理氣血可

愈

連翹三錢　犀角三分　銀花錢半　丹皮錢半　元參錢半　甘草錢半

青蒴葉以上二案俱首項之症皆濕熱風上乘而非腦疽對口也附於首部以便閱者

○對口

光福金　濕熱上壅發為對口幸其紅腫高突督脈所司猶為易治藥劑調和責惟余任起居調養總要自司邪毒不致下陷

羌活　陳皮　殭蠶　石決　銀花　防風

遠志　笋尖　甘草節

黎里毛　偏對口較於正者猶重是足太陽膀胱所主毒易下注最難起發所喜紅活高腫可免內陷之憂然調攝起居尤宜自慎

生黃耆　皂角鍼　甘草　羌活　遠志炭

桔梗　殭蠶　防風

唐栖江　正對口。雖較偏易治但平塌不高。根盤散漫。經所謂督脈經虛從項發。正此謂也。姑擬托化。

人參　毛鹿角　生黃耆　金銀花　角鍼

川芎　甘草節　鮮笋尖

外症腦疽即是對口對口者腦疽之俗名外科金鑑集於項部腦爍腦後發集於首部瘍醫大全另將腦爍腦後發腦疽歸一腦部頗通將對口另歸一門歸項部矣余思腦爍腦後發腦疽對口皆生於腦後髮際之間上下不過分寸之徑症名雖異所過之太陽督脈經絡皆同有何別焉頭為諸陽之首非火不能煆煉成膿骨多皮薄無肉化膿若化火太過與腦門最近壅甚腦氣不得流通腦為腎水之精華最怕熱爍化熱甚則髓熱腦爍神志憒亂神去則死此症外科中大險症也余故將此方案

編於首部之首凡遇此症當慎重焉辛卯仲冬余聽鴻謹識

腦疽對口發於正者反易治何也因督脈起下貫脊行於上故毒氣得之反能衝突高腫使邪毒不致下流低陷乃為外發故多易治督脈主一身之陽陽主通故易化易潰生於偏每謂難治何也因膀胱之脈起於額上貫巔頂兩傍順流由項後而下與瘡毒交合下流故瘡多平塌易陷因太陽膀胱主司寒水其質多冷多沉寒主凝塞故瘡難起難發難化難潰余聽鴻註

○夭疽銳毒

青浦吳　夭疽生於左耳後是七情所發最忌毒不外達多成内陷急投内托以冀紅活高腫為順

製附子　陳皮　皂角鍼　姜半夏　甘草

遠志炭　殭蚕　白蔻殻

長安周　右耳後銳毒形堅硬而頭伏是內發之症頗非輕淺倘

懷抱悒鬱雖有參苓亦奚以為

鹿角片　澄香　黃蓍　甘草節　遠志炭

炮薑炭　陳皮　紅花　半夏麴　角鍼

笋尖

覆方　疽頭得起內膿已化寒熱亦解大有鬆機所嫌根盤散漫

不收此元氣先虛未能載毒而出仍宜溫托助陽漸冀佳境

鹿角尖　枸杞子　川貝母　甘草節　陳皮

遠志炭　半夏麯　皁角鍼　笋尖

夭疽生於左耳後一寸三分高骨處夭者天變之象不得盡其天年屬肝銳毒生於右耳後一寸三分高骨處銳者鋒利之器也屬肺此二者頭多堅硬未潰先黑未膿先腐臭穢易生元氣易敗此書皆七情久鬱膏粱厚味蘊熱而成雖屬肝肺部位在太陽寒水之經其脈從頭下項行身之背終於足外踝經脈下注最易內陷在骨高皮薄肉少空隙之間而近腦髓氣多血少無物成膿毒不得洩鬱火內燔煎爍腦髓故內經曰夭疽癰大赤黑不急治熱氣下入淵液循少陽之脈下胸脇前傷任脈內薰肝肺薰肝肺十餘日死矣若瘍科臨症有決急治得法尚

可十痊五六。倘狐疑不決。拖延時日。不救者多矣。余聽鴻註

○骨槽風

上海張　耳後頸項。痛引項骨。是骨槽風也。飲食難進。寒熱時作。但此症。初則堅硬難潰。久則瘡口難合。宜先與灸法。繼以清陽散火湯治之。

牛蒡子　防風　升麻　黃芩　連翹　荊芥

刺蒺藜　白芷　當歸　石膏　甘草節

江陰董　顋頤堅腫。寒熱作痛。牙關拘急。此係風邪深入骨髓所致。宜與疏解化痰為治。

煨葛根　前胡　青皮　杏仁　殭蚕

牛蒡子　桔梗　甘草　薄荷　茅根

蘆墟孟　骨槽風不斂。多骨顯露。證已經年。愈非旦夕。

刺蒺藜　川貝母　川石斛　穭豆皮　夏枯草

生牡蠣　地骨皮　天花粉　鮮蘆根

又丸方

沙蒺藜　黨參　川貝母　女貞子　旱蓮草

生牡蠣　白芍　中黃汁泛丸　中黃即骨碎補一名鮮毛薑須刮去皮揀白嫩者搗汁生牡蠣當水飛用余聽鴻註

金澤姚　穿顋發破。久積膿成。骨證屬肝胃二火所結。擬舒厥陰兼清陽明治之。

北沙參　丹皮　黑山梔　花粉　甘草
旱蓮草　元參　川石斛　知母　甲蕈
嘉定吳　顴頰抽掣。痛引頸項。此骨槽風之始也。且擬祛風化痰。令其內消為妙。
牛蒡子　防風　前胡　青皮　桔梗
荆芥　殭蠶　茅柴根
北垳孫　耳前頣頰堅腫。痛徹筋骨。此手少陽、足陽明、風火所結。始成骨槽風也。擬搜風清火法。
方缺
唯亭王　顴頣時作抽掣。脉數而弦。此屬肝風上擾。宜滋水柔肝。

佐以祛風為治。

洋青鉛　熟地炭　鈎籐　懷牛膝

刺蒺藜　石決明　池菊

䁯澤葉　骨槽風、久腐孔深、穢水不絕、以致顋穿齒落、是為瘍家逆款、勉以刀圭、亦不過稍盡人事耳。

川石斛　白芍　川貝　花粉　丹皮　知母

茜草根　料豆　銀花

青浦毛　左頰、漫腫堅硬、幾經兩月、漸知隱痛、此酒濕與肝膽之火、互相搏結而成、骨槽風之所由發也。治以清肝化痰法。

青黛　川貝母　蘇子　天竺黃　甘草節

桔梗　遠志炭　殭蚕　枳椇子

劉河汪　顋頤木腫隱痛。以致牙關不利。此肝胃之火。上循牙齦為瘍。是為骨槽風也。

北沙參　川貝　川石斛　生牡蠣　蘆根

枇杷葉　桔梗　骨碎補

覆方　藥合病機。仍從前法。

北沙參　川石斛　骨碎補　生牡蠣　料豆

苦桔梗　枇杷葉　旱蓮草　蘆根

丹徒邱　骨槽風延久。流膿不絕。豈清涼散火所能療治。老膿成骨。宜補托並施。

黨參　茯苓　甘草　知母　元參

川貝　桔梗　瓜蔞仁

常熟蕭　骨瘤疽經年。由五志鬱結而成。春夏之交。每每出血。恬淡其心。自可延年。如計收功。必須仙手。

北沙參　黨參　茯神　川貝　桔梗

海浮石　遠志　牡蠣　紫菜　此症部位相同故集與骨槽風内

嘉禾楊　骨槽風腫破日久。不能盡消。内已釀膿。宜用中和湯托之。

黨參　白芷　藿香　白术　麥冬　甘草

黃耆　桔梗　桂心　白芍　川芎　當歸

南翔陳　骨槽風過投寒涼。以致肌肉堅硬。腫脹。皮膚不仁。古人云。非理中湯佐附子。不能回陽。非殭蠶。不能搜風。即此謂也。如法治之。或可中的。

人參　甘草　製附子　於朮　乾薑

川貝　殭蠶　蒺藜　艾葉

田涇戈　頰車穴堅硬不疼。此係少陰不足。陽明有餘。久延難治。骨槽風之端也。

沙蒺藜　天竺黃　川石斛　桑椹子

旱蓮草　女貞子　杜蘇子　絲瓜絡

某孩　週歲未得穀味精華。溫邪吸入。上焦先受。頭面頤頷浮腫。

邪與氣血混處。刀鍼破傷經絡。溫邪內閉。熱壅蔓延三焦。昏寐痰潮。舌刺卷縮。小泄點滴渾濁。熱氣痼結在裏。但膏、連、梔、芩藥性直降。竟由胃達腸。而熱氣如煙如霧。原非形質可蕩可埽。故牛黃產自牛腹。原從氣血而成。混處氣血之邪。藉此破其蘊結。是得效之因由也。夫溫熱時厲。上行氣分。而漸及血分。非如傷寒足六經順傳經絡者。大抵熱氣鴟張。必薰塞經絡內竅。故昏、躁皆裏竅之欲閉。欲宣內閉。須得芳香。氣血久鬱。必致瘍毒內攻。謹陳大意。聊參末議。先用

紫雪丹三分。微溫開水調服。此一案本風溫時毒症因胃槽風有六淫外發七情虛體內發部位相近集此條下並參

夫骨槽風一症有表有裏有虛有實外感六淫內傷七情膏粱厚味肝膽火鬱俱能成之初生之時耳前及顋頰筋骨隱隱疼痛牙關拘急漫腫無頭或紅腫焮熱皆少陽風邪深入陽明熱痰壅塞水虧木旺肝膽火鬱而成從表邪外發者尤為易治袪風化熱消腫化痰可愈如七情體虛內發者始則堅硬難潰潰則瘡口難合多骨漏管易生元氣易敗臭穢膿水淋漓治不得法不救者多矣細思其故少陽少血多氣脈絡空虛為肝之外府內經云風氣通於肝膽附於肝葉之內於手少陽合為相火其脈皆行過頤頰之間由頤下項易招風邪入內內經云中於頰則下少陽是也陽明常多氣多血陽明者熱氣盛大上下牙

齦屬手足陽明。膏粱厚味積熱於中。壅塞血脈不得流行。風火互結。脈熱肉敗。則膿成矣。二經之脈。從頭走足。經脈下行。從陽入陰。或寒涼太過。凝結難以起發。久則頤穿齒落。莫可挽回。內經曰癰腫筋攣骨痛。此病安生。曰此寒氣之腫。八風之變也。曰治之奈何。曰四時之病。以其勝治之愈也。此數語治法皆在其中矣。況風之爲物。遇隙即入。遇物則張其威。遇火助之。流金爍石。遇寒助之。裂地凌冰。所集案中。初起有清陽散火法。疏解化痰法。堅硬有隔薑艾灸法。舒厥陰清陽明法。祛風化痰內消法。搜風清火法。有虛陽上擾。滋水熄風法。久延流膿。補托並施法。久延不消。和中托裏法。過服寒涼凝結之。回陽搜風法。內關熱

蘊芳香開闢疏絡法方雖十七治法皆備所謂以其勝治愈也雖治法皆宗金鑑若不精於瘍科臨證不聪心如夜光之璧筆如分水之犀豈能心隨意到余之不敢為瘍科者知其難耳余聽鴻註

一婦三十餘歲氣血素虛內夾痰飲咳喘時發始以肝氣入絡流走肢體或痛或愈後有氣從左脅上竄頰車引及項側左額角抽掣極痛按之焮熱微腫始皆疑體虛外風引及內風竄絡骨槽風之見症也初服清解祛風化痰附中痰飲氣逆咳喘俱甚若以二陳苓桂朮甘干姜五味子等服之喘咳可平胸膈舒暢而頰頭痛之更甚纏綿日久余曰肝為風藏膽為相火少陽

之脈絡為水火升降之道路陰分虛則肝熱虛風上擾故升則痛降則痛止肝血少木失涵養木旺尅土脾失運化飲食積蓄為停痰積飲若顧此失彼非其治也當柔肝抑木養榮健脾治風先治血血行風自熄之意用人參當歸身白蒺藜潼沙苑製首烏阿膠服牡蠣棗仁白芍廣皮半夏茯神殭蚕炙草烏梅之類服五十劑而愈 余聽鴻誌

吾同道某始起吐瀉服理中止後舌絳遍體氣竄攻痛惟背脊兩傍痛最甚抽掣項後作强正在太陽之脈服桂枝法亦無效後竄至臍舌絳口糜服祛風平肝養血通絡少效後竄入牙齦頰車項側極痛牙關拘掣不利躁而不煩精神憊倦症頗危險

即服人參、歸身、萸肉、白芍、龜版、熟地、阿膠、麥冬、川石斛、女貞等。滋陰之品。漸漸痛止。後與余曰。醫無成法。此等症醫書皆未經見。若此症作骨槽風治之。危矣。余聽鴻誌

○禿瘡

上海述　髮者血之餘。血不上朝。以致髮落。此謂禿髮瘡證。宜服補益之劑。方有裨益耳。

熟地　黨參　麥冬、白芍　潼沙苑　女貞子

黃耆　玉竹　歸頭、穞豆、刺蒺藜

又膏方　細生地一兩　全當歸一兩　旱蓮草五錢　躑躅花一兩

用麻油十兩。將前藥入油內。熬至枯黑色。去渣。加黃蠟一兩二錢。溶化

收器內用指蘸擦之

又洗藥方　千脚泥二兩　白頭翁一兩　皁莢五枚　黃連三錢　懸龍尾一團

胡荽子五錢　青松毛一兩　銹釘七枚　用陰陽水煎數沸布蘸藥水揩之

躑躅花、即鬧陽花、千脚泥、即糞底泥、懸龍尾、即樑上塵、懸註

湖州章　頭皮搔癢津水淋漓破結膿痂此禿髮瘡也宜搜風涼血治之

川芎　桔梗　防風　山梔　天麻　荊芥

黃芩　池菊　連翹　甘草

木瀆李　因剃髮而成瘡此係腠理不密外風襲入漸漸毛髮脫落血不朝宗理氣補散並進庶頭童者而為黎首矣

熟首烏　白芍　黨參　歸身　佩蘭葉

白蒺藜　黄芩　荆芥　甘草　鈎藤根

横川㧍　不甚痛癢。漸次髮落。未老頭童。豈僅血虧。亦屬風燥。宜養血祛風。

羌活　兔絲子　歸身　乾桑椹　枸杞子

川芎　宣木瓜　熟地　明天麻　白芍

秃髮瘡一症。皆謂胃經積熱生風。或謂肝經鬱熱生風。或謂血熱生風。每以清熱祛風殺蟲之劑治之。實係皆屬肝腎不足。三陽經督脉陽氣皆虛。何也。腎者精之處。其華在髮。女子七歲腎氣盛。四七筋骨堅。髮長極。六七三陽脉衰。髮始白。丈夫八歲腎

氣實髮長五八腎氣衰髮墮六八陽氣竭於上鬢髮頒白足少陽脈起目銳眥上額角足陽明脈起於鼻之交頞中循髮際至額顱足太陽脈上額交巔其支從巔入絡腦還出別下項足厥陰肝脈與督脈會於巔督脈起少腹下過陰器反從脊上衝巔項內經曰腎氣盛則髮長腎氣衰則髮墮陽氣竭則髮白故禿瘡髮落治在腎與三陽也陽氣虛不能衛外腠理不密外風湊襲此為表症涼血祛風一法也血不上朝氣血不得流通物朽亦可生蟲大補肝腎外以鄉燭花油加潤燥涼血殺蟲內外兼治一法也血虛風襲補散並施亦一法也未老頭童養血祛風一法也四方之中填補肝腎俱夾升陽散風之品養血分而兼

通陽若不致衆内經列方豈能如此名人手澤傳後無愧

余聽鴻註

項部

○猛疽

濮院徐　含下猛疽由外感風熱內傷酒濕勢必釀膿但此半月其鋒正銳苟得小膿便爾易治

枳椇子　杏仁　川貝　桔梗　牛蒡子
煨葛根　青皮　甘草　殭蚕　茅根

猛疽俗名結喉毒生於項前結喉之上呼吸之要道皆屬憂鬱化熱或肝肺積熱膏粱炙煿壅熱而成其勢不拘大小先以散腫軟堅解肌化熱冀其速軟速潰膿洩可保若誤用寒涼或成膿不鍼或腫硬太甚膿不得洩咽喉閉塞呼吸不通湯飲不入

半日死矣。內經曰、發於嗌中。名曰猛疽。猛疽不治。化為膿。膿不寫。塞咽半日死。其化為膿者。寫則、合豕膏、冷食、三日已。內經取名猛疽者。因其來勢太猛。倘猛不可遏。命立[illegible]傾也。豈可不慎歟。輯存一方。聊備治法。　余聽鴻註

〇夾喉癰

青浦薛　捧喉毒漫腫無定。根盤紅暈。胸悶不渴。以走散之意。勉擬疎解化毒。以圖轉重為輕。

柴胡　前胡　粉葛　甘草　防風　桔梗

殭蠶　枳殼　茅根

覆方　疎解後。雖潰破。胸悶依然。此內陷之機也。急宜寬胸以望

佳音

蘇子　瓜蔞子　桔梗　廣皮　天竺黄

杏仁　白蔻殼　荷葉

再覆診　腐雖未脫新肌已露四圍紅暈略減脈不數無寒熱口渴已見順兆一路調養得宜可望全愈

黨參　川石斛　橘紅　陳小麥　黄蓍

棗仁　杜穀芽　牡蠣

猛疽俗名結喉毒夾喉癰俗名棒喉毒又名鎖喉毒治法相彷其症大異何也猛疽在任脈之位任脈起中極之下從腹一直上衝咽喉上頤入目其脈夾肝肺之積熱上升來勢猛烈恐其

阻塞、呼吸飲食之險。較偏者、易起易潰。捧喉毒、生於喉之兩傍。在手三陽、足少陽、陽明之位。又兼足厥陰、蹻脈、過其間。手太陽脈、從缺盆循頸上頰。其病有頰腫、頷腫。手陽明脈、過缺盆上頸貫頰。其病有頸腫。手少陽脈、出缺盆上項、從耳後屈下頰。其病頰腫、嗌腫。足陽明脈、循喉嚨入缺盆。其病有頸腫。足厥陰脈、循喉嚨之後、上入頏顙。陰蹻脈、由足上缺盆、上出人迎之前、頰傍夾喉動脈入頄、與陽蹻而上、氣并相還。足少陽之脈、下耳後、循頸、其加頰車、下頸、合缺盆。其病有頷腫、夾喉癰。足厥陰、足陽明、風熱毒熱上攻而成。因經過之脈太多、氣血流散不聚。每堅硬漫腫無頭、易於平塌。若外感風熱、在表者易治。若膏粱厚味、積熱於胃。

或憂思鬱結。厥陰肝血內虧。少陽膽熱上升。在裏者難治。即與失營馬刀瘰癧石疽等相似。若誤服寒涼平塌內陷。誤服補熱毒火壅塞喉閉不通。變成危症。若寒涼凝結堅硬難潰。潰則難合。腠水淋漓延成瘡怯。皆醫之過也。今輯留一案。始以柴胡疎通少陽。葛根疎通陽明。加搜風解表。一法也。潰後餘毒欲陷。輕劑化痰和胃。一法也。潰後毒盡氣血並調。清熱化痰和胃軟堅一法也。存方雖三。治法極密。勿以方輕平淡忽之。若不細考內經。臨症熟悉。列此三方豈易哉。余聽鴻註

○風痰

青浦孫　痰毒勢欲作膿。胸煩口渴。須防驚厥之變。又值酷暑相

侵纖小之軀。扶持不易。姑宜末藥。

真珠　牛黃　天竺黃　川貝　辰砂

爲細末鈎藤湯下

德清龐　風痰毒。

薑汁製天南星　竹瀝炒陳半夏

天竺黃　桔梗　防風　荊芥　白蒺藜

荷葉蒂

無錫吳　風痰發於少陽。藥以和解。

柴胡　鈎藤　防風　歸身　半夏　陳皮

杏仁　殭蚕　白芥子

劉女　年十六。天癸不至。頸項癭痰。入夏寒熱。咳嗽。乃先天稟薄。生氣不來。夏令發洩致病。陽氣不肯收藏。病屬勞怯不治。

戊己湯去白朮

糜氏　頸項結核。腹膨足腫。肝木犯中。痰氣凝滯。

牡蠣二兩　澤瀉一兩五錢　夏枯草三兩　半夏炒二兩　厚樸一兩五錢

橘紅一兩　神麯二兩五錢　茯苓二兩　生香附一兩　水磨汁泛丸

氣鬱痰核。

夏枯草　生香附　丹皮　山梔　連翹

赤芍　鬱金　橘紅

王四十　脈左數右長。頸項結癭。時衄。

生地　丹皮　犀角　鮮夏枯草　鈎藤

山梔炒　土貝　薄荷

因嗔怒失血以來。致頸項左右筋腫痛連背部。此鬱傷氣血經脉流行失司。已經百日不痊。竟有流注潰膿。延綿之憂。治在太陽少陽。

生香附　夏枯草　薄荷梗　鈎藤　丹皮

黑山梔　鮮橘葉　鬱金

頸項痰核。不外乎風邪入絡。憂鬱氣結。氣血失於流通。凝痰於絡。俱在陽明少陽部位。故輯存治表三方。治裏四方。質之高明參酌。余聽鴻註

○痄腮

蘇州查　風痰夾滯結於兩頤。發爲痄頤腫痛幾及匝月。其勢必潰。用加減牛蒡子桔梗湯。以得膿爲效。

葛根　殭蠶　桔梗　赤芍　牛蒡子

前胡　甘草　橘皮　茅根

附　頷上脹鼻息不通。牙關頰車開合不利。頤腫。此乃足陽明交會之地。據述喉腫之後。始起。宜從陽明治。而開合不利。是挾風使然。

葛根　犀角　生地　丹皮　杏仁

桔梗　連翹　山梔

痄腮一名髭發，一名含腮毒，在二陽明之界。手太陽亦過其間，屬足陽明胃經積熱所致，或風熱所乘，與時毒、風痰、骨槽風[illegible]症同類異名也。若焮腫連耳下者，屬足少陽經。若連頭及耳[illegible]者，屬足少陰經。臨症諒人之氣血虛實、病之新久，宜散宜補，宜涼宜熱，斟酌治之。立齋曰：此症而有不治者，多泥風熱，執用寒涼之劑耳。採存二方，亦備一格，與項症中合而參之。 余聽鴻註

○燕窩瘡

句容莫　燕窩瘡色紅，熱痒微痛，搔破則黃水浸淫成片，由脾胃濕熱而成，宜芩連平胃湯主之。

茅朮炭　黃芩　生甘草　橘皮　川黃連

薑汁炒真川厚樸

此即外科金鑑成方。色紅熱痒。芩連苦寒化濕熱。又苦以化燥殺蟲。合平胃樸朮苦以燥濕。橘皮健脾。甘草調中兼解毒。而和藥性。恐苦寒傷胃。脾健濕去。熱退癢止。濕盡滋水收矣。以藥合之不必加減。見是病。即用是方。可見其用成方之妙。能靜註

○失榮證

元墓董　失榮已潰。愈燗愈堅。不時滲流血水。脈形皆現虛象。是謂敗症。但不可棄而不治。古人立和營散堅丸最爲恰妥。舍此別無他法矣。

人參　熟地　當歸　桔梗　升麻　茯苓

白芍　陳皮　昆布　紅花　白朮　川芎

川貝　海粉　甘草　香附

為末夏枯草膏泛丸

太倉陳　頸項痰核。推之不動。按之如石。失榮已成。

石決明　新會皮　滑石　甘草　連翹

川貝

江陰顧　症係失榮。由肝氣鬱積而成。消之不易。全憑耐養為妙。

甜葶藶　瓜蔞　川貝　杜蘇子　澄香

橘葉

覆方　證似輕鬆。仍以散堅開鬱。

青橘葉　通草　蔞仁霜　蘇子　川石斛

鈎藤　川貝　月石

又丸方

毛沉香　白芍　茯苓　甜葶藶　川貝

天竺黄　海浮石　杜橘紅　夏枯草湯泛丸

失榮一症、其名不可思議、大約與馬刀、俠瘿類同名異也、失榮者、皆屬少陽憂思鬱結者多、外感風邪者少、内損症也、失榮者、嘗貴後賤、嘗富後貧、處先順後逆之境、失其尊榮、鬱結而成、故名失榮也、鄙見是否、明家教正、内經曰、嘗貴後賤、雖不中邪、病從内生、名曰脫營、貴時尊榮、賤時屈辱、心懷眷慕、志結憂惶、病從

内生。血脈虚減。名曰脫營。嘗富後貧。名曰失精。五氣留連。病有所并。嘗富而從欲。貧奪豐財。內結憂煎。外悲過物。然則心從想慕。神隨往計。營衛之道。閉以遲留。氣血不行。積并為病。內經雖概而言之。人處先順後逆之境。經曰。思則氣結。憂愁者。氣閉而不行。失榮等症成矣。方書所謂鬱則達之。如木鬱則達之也。達者。通暢流利之義。不獨木也。諸鬱皆欲達也。其起之始。不在藏府。不變形軀。正氣尚旺。氣鬱則理之。血鬱則行之。腫則散之。堅則消之。久則身體日減。氣虛無精。顧正消堅。散腫其病日深。外耗於衛。內奪於營。滋水淋漓。堅硬不化。溫通氣血。補托軟堅。此三者。皆鬱則達之義也。不但失榮一症。凡鬱症治法。俱在其中矣。

若治不顧本犯經禁病禁氣血愈損必為敗症故輯五方質之瘍科須究心焉 余聽鴻註

○馬刀癧

吳江徐　虛痰入筋絡項側脹硬形長如蛤名曰馬刀證由不足而發除根非易茲與煎劑冀其漸漸消磨

半夏　昆布　甘草　元參　川貝

夏枯草　左牡蠣　忍冬藤　白芥子

蘇州孟　咳嗽遺洩頸項結核證屬馬刀最忌腐潰診得脈寸關微爽尺脈如絲其為陰虛可證姑宜毓陰化痰治之

生地　茯苓　麥冬　牡蠣　米仁　川貝

北沙参　白芍　夏枯草

震澤倪　鼻淵已久。近加項下結腫如李。堅硬。此陰虛體質。又感風熱所致。

牛蒡子　杏仁　荊芥　鈎藤　元參

桑葉　川貝　夏枯草

○瘰癧

太倉李氏　頸項結核。將成瘰癧。此症。多因肝氣不和。須情懷寬暢。庶幾刀圭有益。

鱉甲　夏枯草　石斛　青黛　海浮石

川貝　天竺黄　料豆　荷梗

高郵繆　項頸結核。沿竄胸脇之間。纍纍相連。没此起彼。斂而復潰。此乃腎陰虧。肝陽易動。致因脾土飲食漸少。宜調養性情。抑肝扶土。慢期奏效。若專於消剋。必致虛怯矣。

黨參　川貝　牡蠣　穀芽　沙蒺藜

橘白　料豆　石斛　黄蓍

嘉興譚　瘧破經久不斂。氣血虧弱可知。理應益補。但胸間又見結腫。虛痰滋蔓。延久難圖。當益補化痰兼治。庶潰者斂。而腫者消矣。

半夏　橘白　石斛　甘草　竹茹

參鬚　麥冬　黨參　枇杷

蠡野朱　燕窩癧且與丸方

京山棱　橘核　連翹　薑汁製南星

天竺黃　海浮石　滃香　白礬

用竹瀝水泛丸八角茶泡湯送下

唯亭王氏癧串破久不愈經止五月潮熱脈數此屬血海空虛丹溪謂癧瘰屬膽有相火而且氣多血少婦人見此尤忌若月事以時下寒熱不作方保無虞若變潮熱其症危矣今擬滋養厥陰以冀熱退經至為愈

雞血炒丹參　茺蔚子　銀柴胡　白歸身

酒炒白芍藥　地骨皮　金石斛　天竺黃

川貝　紫菜

青浦周　癧在耳後。屬少陽所司。開鬱化痰為治。

羚羊角　元參　牡蠣　薄荷　海藻

夏枯草　蛤殼　川貝　連翹

常熟俞　先後天交虧。以致表寒骨熱。頸項串癧。防成虛勞。

地骨皮　海螺　鱉甲　米仁　石斛

天竺黃　海粉　茯苓　川貝　元參

北沙參

南京葉　血證。時止時來。嗆咳。忽緩忽甚。癧瘍焉能得愈。所謂用藥無效。一不治也。

北沙參　紫菀　石斛　茯苓　鮮藕

清阿膠　川貝　麥冬　牡蠣　茅鍼花

瓜蔞皮

張墓陸　外體雖豐內本不足頸項結腫近加膝脛痠楚正合肥人多痰之論痰盛而氣必虛風邪易湊搏於肺經肝主筋故令筋縮而腫初如豆粒後若梅李連續不一成為串癧纍纍難旦夕取效擬清肝化痰以消息之

青橘葉　牡蠣　秦艽　茺蔚子　刺蒺藜

天竺黃　川貝　丹參

癧有三曰痰癧曰瘰癧曰筋癧筋癧為肝木不舒此名筋癧能靜

接服方　鈎藤　橘皮　八角茶　橘葉
川貝　桑椹子　秦艽　續斷

嵗澤吳　頭悶痰癧。久咳不已。怯症漸成。
地骨皮　川貝　牡蠣　元參　杜蘇子
北沙參　杏仁　紫菀

蘇州李氏　素患痰癧。有潰有不潰。總屬虛症。今見寒熱。食減。經信久睽。足三陰並虧。耐養方得延年。
生地　元參　地骨皮　夏枯草　嫩鈎藤
土貝　丹皮　石決明　茅柴根

婦人以血爲主。足三陰者。太陰統血。厥陰藏血。少陰藏精。三陰

精血不足。血脈乾澀。經水不通。氣鬱不行。瘰癧成矣。駐鴻註

江甯彭　瘰癧、有風熱、痰、三毒之異。與結核、寒熱、有殊。其症多生於頸項、胸、腋、之間。形名雖異。總不外恚、忿、鬱熱所致。遇怒脹甚名曰、氣癧。宜息氣調理。今見增寒壯熱。咽、項强痛、結腫不消。宜散腫潰堅湯加減主之。

京山棱　昆布　當歸　白芍　連翹

軟柴胡　海藻　甘草　黄芩　花粉

左牡蠣

此方、用海藻甘草之反。古人立方每每有之。甘遂甘草取其反者。可攻蟠踞內之堅痰。甘草海藻取其反者。攻其凝外之堅痰。

也。如人參五靈取其相反。正虛血凝。五靈遇人參。其攻瘀之力更速。瘀去正安。恐正氣不接。故賴人參之力續之。古人用藥如用兵。此激將法也。激其怒烈性起。萬軍堅壘之中。搗其窟穴。斬旂梟帥。立建奇功。何懼堅硬不消也。此東垣散腫潰堅古方加減能靜註

德清袁　耳下子母瘰癧。串至缺盆。推之動。按之有根。屬手足少陽二經所發。症在陰分。又見潮熱咳嗽。恐成勞怯。

北沙參　茯苓　瓜蔞皮　元參　昆布

甜杏仁　穞豆　地骨皮　牡蠣　橘皮

常熟黄　項後兩傍結核。日月已深。屬太陰寒水所司。外受風邪。與內濕凝結。初忽不知。後方知痛。皮色泛紅。有釀毒之兆。理宜

溫托不可專事寒涼

法半夏　陳皮　香附　益智仁　川芎

製殭蚕　薑黃　甘草　夏枯草

瓜洲錢　脾虛失運肝膽氣滯濁痰注於肌肉成核成癧消之不易痰隨氣行氣順痰消宜通陽消濁法

旋覆花　茯苓　半夏　於朮　白芍

白芥子　海浮石　桂枝　歸身　甘草

無錫謝氏　瘰癧寒熱盜汗脘中瘕聚紅潮失信大便溏薄咳嗽食減春深至冬未痊此乃鬱損成癆難治之症

香附　丹皮　歸身　白芍　牡蠣

川貝　茯苓　夏枯草　橘葉　竹茹

光福胡氏頸項結核。寒熱盗汗。此乃憂鬱不解。氣血皆虚。倘若經阻。便難調治。

當歸　白芍　甘草　橘皮　茯神　蒺藜

鈎鈎　南棗（謝胡兩案與棗案當同病症相符未尚不可用成法也故留之駢註）

又丸方

生地四兩　遠志七兩　川貝一兩五錢　白芍一兩二錢　西洋參五兩

蒺藜二兩　川芎二兩　茯苓一兩五錢　歸身二兩

外用夏枯草八兩　海浮石五兩　海藻二兩　蛤殼五兩　乾貝四兩　生石決五兩　煎

液泛丸

嘉禾沈　瘰癧丸方

製首烏四兩　元參四兩　薄荷四兩　黨參三兩　生地四兩

歸身二兩　白芍二兩　天麻一兩五錢　嫩防風二兩　草節二兩

川芎一兩五錢　肥皂三十錠　十錠炒黑　十錠醋炒　十錠熬膏

煉蜜為丸　兩丸方以古酌今頗有意味聽鞋

某　瘰癧之生。膽汁不足也。而木火因之上升。失血欬嗽驚瀍所謂上傳及肺。末傳寒中也。溢則碍脾。燥則碍肺。兼顧方穩。

人參　霞天曲　蓮肉　穀芽　淡菜

沙參　米仁　鮮藕

陳十七　癧勞在出幼之年。形脈生氣內奪。冬月可延。入夏難挨。由真

陰日爍救陰無速功故難治

兩儀煎

朱三四瘰癧馬刀都是肝膽為病病久延及脾胃腹滿便濇舌黄微渴非温補可服泄木火以疎之和脾胃以調之冀其脹勢稍減

吳萸　川連　生於术　川楝子　炒山查

厚樸　青皮　黑山梔　椒目

趙氏　瘰癧寒熱盜汗脘中瘕聚經期不來大便鶩溏嗆咳減食春深至冬未痊此乃鬱損成勞難治之症

香附　丹皮　歸身　白芍　川貝

茯苓　牡蠣　夏枯草

胡氏　頭項結核。暮夜寒熱盜汗。此乃憂鬱不解。氣血皆虛。倘若經阻。便難調治。

炒當歸　橘皮　白芍　炙草　茯神

鉤藤　南棗

沈氏　素有痰火氣逆。春令地中陽升。木火上引巔頂。腦熱由清竅以泄越。耳鳴鼻淵。甚於左者。春應肝膽。氣火自左而升也。宜清熱散鬱。辛涼達於頭而主治。

羚羊角　黑山梔　苦丁茶　青菊葉

飛滑石　夏枯草

又方　照方去滑石加荷葉生石膏

又　性情躁急陽動太過氣火上升鬱於隧竅由春深病加失其條達之性經言春氣病在頭也考五行六氣迅速變化莫若風火腦熱暗泄而為鼻淵隧道失和結成癭核夫東垣升陽散火丹溪總治諸鬱咸取苦辛為法然藥乃片時之效欲得久安以怡悅心志為要旨耳

連翹心　土貝　海藻　昆布

黑山梔　川芎　香附　鬱金

屠（三四）秋瘌半年未愈瘰堅硬痛瘍膿鬱久成熱府經病淺可冀其愈

夏枯草　香附　茯苓　苡仁　川貝

丹皮

陳　躁急善怒氣火結瘿爍筋為痛熱鬱化風氣阻痺塞則腹鳴脘脹木已尅土當兼健脾開鬱聽註苟非開懷歡暢不能向安

土貝母　鬱金　海藻　白芥子　夏枯草

瓜蔞皮　山梔　昆布

瘰癧一症其名雖多不外乎外感六淫風寒暑濕之邪內傷七情憂愁思慮之鬱外感者氣血未虧屬表屬經陽症易治內損者營衛已傷屬裏屬藏陰症難愈丹溪曰瘰癧皆起於少陽一經余細考內經惟少陽經有馬刀俠瘿曰其癧堅而不潰者名曰馬刀挾瘿急治之細思其故恍然而悟少陽者風火之府也

而為相火風氣通肝與少陽合故風火先犯少陽也如傷寒先犯太陽寒水同氣相求易合因少陽屬木木最易鬱木鬱不達精血内消水不涵木相火易升故瘰癧表裏虛實皆始起於少陽一經耳内經一言盡之矣雖則起於少陽如傷寒起於太陽藏府六經皆可傳徧不獨少陽一經也故治癧當分六經有少陽之風熱氣鬱太陽之寒濕凝結陽明之濕痰壅熱太陰之腹脹便溏少陰之咳嗽内熱厥陰之經阻腹痛俱有兼症外症皆由内發治外當兼治内也今輯三十餘方治法雖未盡亦可見其大概矣方書曰不犯經禁病禁如傷寒太陽寒熱誤投少陽柴胡引邪入裏矣太陰之下痢誤投少陰阿膠黃連即成敗症

矣藥一錯悞豈堪設想內經云、毋盛盛毋虛虛損其不足益其有餘此二者醫殺之即此意也如病家調理自犯經禁病禁雖名醫良藥亦難愈若有所誤與成敗症豈可不慎歟如外治薄貼鍼砭圜灸等法各有師承不在立方之內不揣譾陋聊作芻言質之高明余聽鴻註

附案　琴川東鄉、周姓、農婦、早寡、無嗣、有田面四畝、出錢承種完租者謂田面業主收租者謂田底夫兄爭之不休憂鬱而成脇脘痛項側兩傍起核堅硬就診於余曰憂愁氣閉不行思則氣結忿怒則肝火上犯久則失榮馬刀成後不治矣幸經水極少未絕猶可挽回余勸其將田面讓於夫兄勿因此多累也紡織亦可度日惜貧病相

連無資服藥余勸伊無事行坐默念南無阿彌陀佛可解愁緒而絶忿爭之念使肝氣條達虛火不升而可冀延歲月以鮮羊芍切片晒乾二斤川貝母二兩薑半夏三兩共為細末用淡海藻二兩昆布三兩煎汁泛丸臨臥用雪羹湯（淡海蜇三錢 大荸薺五枚）煎汁送下三錢再用歸脾湯原方倍木香加柴胡白芍三天服一劑經三月餘項塊消軟脅痛止信水依時諸恙霍然後送余紫花小布一疋因其誠篤而受之若不勸其讓産念佛終日擾嚷不休未必不死於鬱症也（聽鴻記）

橫涇有王姓婦因其夫私有外遇不顧家事有兒女各一男六歲女三歲夫妻反目吵擾不休氣鬱日久左項堅硬脘痞脇痛

嘔吐腹痛經阻三月醫皆疑爲妊後就余診之按脈堅硬而嗇面色青黯無華豈有妊娠之理後其細述家事氣血久鬱防延變內熱咳嗽不能治矣問其夫偕來否曰在寺前買物使之先來停刻即至也其夫來寓余曰症由鬱怒傷肝非妊娠乾血勞難治矣察其夫面色略變傍徨之狀尚有不忍之心余曰若能依我三事尚可挽回若不能依延他醫治之其夫問故余曰一要三月不能出外在家代其勞二要順其性倘有加怒不可違拗三要懸懸服侍湯藥調理飲食寒暖如能依此一方可痊其夫一一遵之早服歸脾丸三錢晚服逍遙丸三錢再用歸芍六君湯加二陳香附柴胡一月服十劑用海蜇紫菜等作羹食調

理三月餘。項間腫硬已消。月事以時下。夫妻反好如初。後偕余寓。擬一膏方。余見之欣喜。所以為醫者。關人骨肉。口邊功德不可不積也。若七情鬱症。不順其性。十難愈一二耳。余聽鴻誌

常熟、某、素性誠實儉樸。完姻數載。起馬刀失榮。從耳後項左側脹硬如臂。潰破膿水淋漓。咳嗽吐血便溏。大肉皆削。諸謂不治。余曰、白髮在堂。襁褓在抱。若棄而不治。於心何安。然、貧病相連。家窘不能服藥。孫真人謂一不治也。有其內姊丈某解囊助藥資。余璧診金。盡心調理。服甘溫調脾。便堅欬甚痰多。即用甘涼清潤。金土同調。咳減便仍溏。更番金土而治。如斯者三月。後脾胃漸旺。大便稍堅。納增欬減。後以歸脾法。加疏通氣血之品。再

以和榮散堅丸兼服臥床載餘項腫潰爛亦斂堅硬全消起復如故倘醫知難而退親戚不肯解囊亦不治之疴所以爲醫當盡心爲親戚當盡力絶症亦可勉力挽回親戚中疾病相扶者余甚義之 臨鴻誌

○時毒

震澤崔　風温熱將兩候風陽上擾以致面浮項腫濕熱內蟻陽明熱結而大便不通熱蒸之氣上蒙清竅神識不清診脈左弦而數右關洪大舌苔糙黄略帶灰色此乃時毒大頭瘟也議以疎風清熱兼通陽明以冀便通熱減是爲鬆機

羚羊片　連翹　花粉　黄芩　枳殼

牛蒡子　薄荷　黑豆　象貝　知母

黑山梔　蘆根　竹葉

復方　熱勢已減脈象數而稍緩頭面紅腫未退舌色乾紅有

時鼻衂初起邪在氣分熱久漸入營分風乃天之陽氣溫乃化

熱之邪兩陽薰灼上焦先病大便已通神識亦清再當清心營

清肺衞自然漸安

犀角　鮮生地　花粉　連翹　菊葉

川貝　牛蒡子　馬勃　知母　蘆根

桑葉　忍冬花露

荆溪張　風温時毒寒熱頭項腫痛以其一潰證自爲殊

煨葛根　柴胡　杏仁　馬勃　僵蚕

牛蒡子　前胡　桔梗　甘草　茅根

上海金　胸項俱腫。寒熱無汗。此時毒也。宜袪風達邪為妥。

荊芥　牛蒡子　前胡　青皮　防風

厚樸　貫衆　甘草

黎里徐　發成時毒。胸膈不利。咳嗆牽引則痛。痰熱交滯。肺胕受傷。法宜達邪行瘀。佐以化痰托毒。

柴胡　枳殼　鉤藤　蘇梗　青皮　杏仁

桃仁　桔梗　葛根　茅根

楓涇秦　風毒已有十餘日。毒尚不化。脉數無力。此正虛邪旺之

故宜散邪寓補。

黨參　川石斛　殭蚕　生黄耆

桔梗　生甘草　角鍼　青荷葉

唯亭朱　病因耳項浮腫。是屬風邪。寒熱胸滿。神識不清。是屬裏熱。擬清散之法。以冀熱退神清。

葛根　杏仁　防風　橘紅　牛蒡子

前胡　桔梗　殭蚕

太倉龐　時毒。法以疎散之。

牛蒡子　荆芥　甘草　馬勃　杏仁

豆豉　防風　桔梗　蟬衣　貫衆

西湖柳　茅根

張　温邪自裏而發。喉腫口渴。舌心灰滯。上焦熱蒙。最怕竅閉昏痙。苦寒直降。攻其腸胃。與温邪上鬱無涉。

連翹　黑梔皮　牛蒡子　杏仁　花粉

馬勃　瓜蔞皮　夏枯草　金汁　銀花露

史　頭形象天。義不受濁。今久痛有高突之狀。似屬客邪蒙閉清華氣血。然常服桂附河車。亦未見其害。思身半以上屬陽。而元首更為陽中之陽。大凡陽氣先虛。陰邪上入。氣血瘀痺。其痛流連不息。法當宣通清陽。勿事表散。以艾焫按法灸治。是一理也。

吾師曰項之上為陽中之陽不可輕灸總要認病真切可灸則灸之聽鴻註

熟半夏　北細辛　炮川烏　炙全蠍　薑汁

人　陽氣為邪阻、清空機竅不宣、考周禮採毒藥以攻病、藉蟲蟻血中搜逐、以攻通邪結、乃古法、而醫人忽畧者、今痛滋腦後、心下嘔逆、厥陰見症、久病延虛、攻邪須兼養正、

川芎　當歸　半夏　薑汁　炙全蠍

蜂房

史姓兩方、因頭腫高突、可知厥陰之脉、與督脉會於巔、恐見此症作風溫誤投涼藥、故特錄之、以便臨症與時毒並參、勿致溫涼錯誤、聽鴻註

某　風熱毒閉項後腫、

竹葉　滑石　牛蒡子　蘆根　馬勃

薄荷　連翹　黑山梔　川貝　生甘草

經云、上焦如霧而象天頭為諸陽之首諸陽之脈皆聚於面風與火為陽邪上先受之元首為陽中之陽與風火同氣相求易合人在風中如魚在水中呼吸出入賴以養生賊風虛邪不能避也時毒者四時不正厲疫之氣隨風而至肺合皮毛鼻為肺竅天氣通於肺地氣通於嗌或皮毛受邪或吸之於鼻傳之於肺或亢熱日久水中之毒蘊之於胃風氣通於肝少陽風木外府與三焦合為相火風毒鬱於上焦與諸陽之脈合而為熱天行時疫大頭瘟、項腫時毒等症成矣膻中者、清虛之處本不能

受邪而最易受邪者何也胞絡之中心肺居之心為君主肺為相傳心肺在上行一身之營衛風溫先犯肺衛熱阻上焦氣分所謂清陽之邪中上是也急宜輕清辛涼解上焦之邪若誤投溫燥熱邪相搏或大汗傷陰熱邪內陷傳入營分先犯心主宮城陷入手厥陰即神昏譫語痙厥陰症見矣疫邪屬毒隨人體質而化有夾熱夾寒夾濕夾風之殊又有上中下三焦之分傳經虛實之辨輯存一十二方熱在氣分者羚羊等徹之傳營分者犀角地黃等涼之邪滯於膈未化熱者厚樸防風等開之瘀滯者桃仁青皮等行之正虛邪旺參耆等托之熱邪蒙秘金汁花露等潰之附厥陰頭腫二方非時毒症恐溫涼誤治也如陽

明之葛根、少陽之柴胡、桔梗之載藥上浮、恭入各有妙用、所以醫如上馬之將、操舟之子、無一定章程、全在臨時變通也。余聽鴻註

附案　常熟塔後孫姓嫗、年六十餘歲、始因寒熱、子媳不暇問、及至六七日、頭腫如斗、色紅、滿面水泡、大者如栗、小者如豆、兩目合縫、舌黑神昏、撮空囈語、痙厥、皆欲承氣等下之。余曰、熱邪溫毒、先犯上焦、熱薰膻中、如煙如霧、無質之邪、蒙蔽胞絡、苦寒直達、攻其腸胃、不能及上焦膈中之病、反使高年氣弱、乘虛下陷。何如先將細磁拷碎、擇鋒利者、夾在筋頭上、紮好、將面上之泡砭盡、用棉拭乾滋水、將芙蓉葉、青黛、大青葉、人中黃研末、鮮菊葉搗汁調敷、乾則以菊葉汁潤之、先研至寶丹一粒、井花水

調服再以犀角羚羊赤芍連翹中黄梔皮竹葉石膏紫草忍冬花露等輕清之劑服之一周時腫勢全消熱去神清再服白虎加人參湯竹葉石膏湯數劑而愈余聽鴻誌

時毒風痰卞腮蝦蟇脹大頭瘟等症大江之南春夏間最多冶亦不知凡幾能致命未見惟癸巳冬見一異症是冬無雨雪亢旱而熱某官上口唇忽起一瘰某醫以謂是疔用刀挑破折以藥條外痂結好後忽面腫漫延至頭皆腫羣醫集至有云大頭瘟有曰遊風毒有曰疔走黄有曰面遊風各執一見病家疑慮不決方亦不敢亂服挨延數日胃氣日憊煙穀不進後又一醫曰此疔毒竄於絡中非大寒退熱不可犀角羚羊金汁琥珀等

品。另服梅花點舌丹四丸。有友與余言及此症。余素不諳外癰。曰無論大頭瘟疔毒時毒溫毒則一也。以輕重之間分之耳。然人元氣有虛實。體質有寒熱。膏粱之體必虛。嗜煙之體必寒。梅花點舌丹香竄。必耗散真元。寒藥過度。必損胃陽。熱雖退。正氣必不支矣。服藥後頭腫漸退。元氣日敗。毒陷不起。兩目出膿。耳鼻皆流血水。口吐血痰而斃。余思此症。不知如何治法。留貲高明。倘遇此症。立定章程。不致滴者太慘耳。是冬瘟症盛行。種過牛痘者。皆出天花。服寒涼藥僨事者多。吾同鄉方孝廉令郎二人。一十九歲。一十八歲。余俱以溫補養元托漿和脾胃。上漿結痂皆順。雖痘症要先去毒。余思年長衰老出痘。非虛不能受此

瘟邪又兼深冬陽氣潛藏天寒秘蟄非溫補內托不可若在春夏陽氣浮越小兒體質強壯有實熱寒涼亦必需也見病治病隨症立方是為真的專信陳說拘執寒涼偏於溫補非為上工瘟毒亦然

余聽鴻誌

面部

○目瘍

崑山鮑　眼胞痰核。堅硬不痛。漫延已久。皮色不變。推之移動。在皮裏肉外。由濕熱痰氣鬱結而成。擬二陳化堅法。令其消散。

半夏　橘皮　甘草　石決明
殭蚕　茯苓　黃連　車前葉

菱湖曹　眼胞紅腫。形如椒粒。名謂椒瘡。係脾胃濕熱所致。姑擬清脾涼血法。

防風　赤芍　白鮮皮　橘皮　厚樸
荊芥　元參　蟬退　連翹　甘草

金壇貫　目大眥、睛明穴、作痛微腫。病出厥陰風火。發在太陽經穴。瘡勢雖小。根源甚深。潰破多致成漏。議疎風清肝。務令消散。

黑山梔　歸尾　荆芥　薄荷　連翹

忍冬花　甘草　夏枯花

嘉善柳　睛明穴、淚液過多。以致目乾細澀。時作抽痛。差喜外皮未破。姑與丸藥理之。除根不許。

沙蒺藜　北沙參　穭豆皮　潞黨參

雲茯苓　女貞子　象牙屑　荷葉蒂

九製首烏

盧墟崔　脾胃濁痰。肝經氣鬱。結於兩眼胞。成為結痰。形如豆粒。

不痛不癢。似乎小恙然、久積不治、損目之端也。

川貝　天竺黃　苦桔梗　石決明　杜蘇子

桑葉　夏枯草　法半夏　新會皮　海蛤粉

桐鄉鄧　漏睛瘡。膿從大眥內出者、例難收口。

黨參　歸身　茯苓　炙草　熟地　白芍

於朮　麥冬　丹皮　地骨皮　桑椹子

蠡墅莫　眼胞困毒。堅凝不痛、纏綿經年不愈。漸脹垂下。以致目不能視。屬脾濕鬱熱而成。宜涼膈清脾飲主之。

生地　荊芥　連翹　黃芩　煅石膏　生梔

防風　薄荷　赤芍　甘草　燈心

附清涼丸方洗　石菖蒲　歸尾　羌活

杏仁　地膚子　赤芍　膽礬　川連

共為細末、以薄綢包之、如櫻桃大、米泔水浸泡、乘熱蘸洗擦之、

勿見塵土、為妙、

黎里陳　眉稜骨、高腫。堅硬如石。名曰石疽。有失血之慮。宜聽其

自潰。可轉逆為順。

黨參　川貝　丹參　牡蠣　茜草

白芍　黃蓍

附圍藥方　三稜　白芨　廣木香　鬱金

南星　蓬朮　青木香　土貝　半夏

覆方　眉稜較前愈覺高腫。仍然硬而不軟。即使得膿。難免損□
之虞。

黨參　川貝　阿膠　黃蓍　參山膝

白芍　棗仁　茯神　膽星　天竺黃

嘉善范氏　右脈弦數而滑。衝任不足。痰液凝滯空隙之地。潰則々[illegible]
致成漏。時值酷暑。且與丸藥理之。

桑葉　川貝　丹參　香附　阿膠

牡蠣　茯神　丹皮

同里袁　睛明成漏。旋發旋平。以屬疽後餘毒。最難絕源流。

西洋參　地骨皮　甘草　陳皮　夏枯花

川貝　桔梗　銀花

某　風溼上鬱。目赤。脈左弦。當用辛涼散之。

桑葉　夏枯草　連翹　草決明　赤芍

某　失血後。復受燥熱。左目赤痛。當以辛涼清之。

鮮荷葉　冬桑葉　生甘草　赤苓皮

菉豆皮　穭豆皮

鮑　秋風化燥。上焦受邪。目珠赤痛。

連翹　薄荷　黃芩　山梔　夏枯草

青荷葉　苦丁茶　桑皮

顧　頭額悶脹。目赤。

羚羊角　夏枯草　草决明　山梔皮
連翹　生香附

潘　頭面風腫。目起星。是氣中熱。
羚羊角　夏枯草　薄荷梗　穀精草　丹皮
小生地　望月砂　連翹　山梔

某　肝火上鬱。目眶紅腫。
連翹　赤芍　鮮菊葉　黑梔皮　苦丁茶
夏枯草

某　目胞浮腫。不飢不運。
桑皮　茯苓皮　大腹皮　廣皮　薑皮

苡仁　通草

常熟陳　嗜煙太多。本屬陽虛。喝雉呼盧。通宵不寐。陰陽倒置。兩目暈紅。色淡。晝昏夜明。視物有歧。內經云。目者。心之使。神之舍也。營衛魂魄之所常營也。故神勞則魂魄散。志意亂。故陰陽不得合而精明也。治宜益氣升陽。參固神志。安逸調理。可不致氣脫失明之患。

黨參　黃耆　柴胡　歸身　炙甘　遠志

棗仁　木香　茯神　蔓荊子　製首烏

問曰。聖人治病。本無專科。今人分科。反使各立門戶。大失內經本旨。師曰。列方本從內經。刀鍼手法。各有師承。故咽喉。瘍科。眼

科不得不分。答曰內經靈素先論九鍼。諸科之中。各有妙用。師曰書者。規矩也。刀鍼手法巧也。立方可循規蹈矩。刀鍼手法各有專歸。古時倉公氏以診聖。仲景氏以方聖。華陀氏以鍼灸雜法聖。即分專科之始也。大約治病立方不出內科之範圍。譬如治傷寒。不循六經。鮮有不悞者也。目者。經曰五藏六府之精氣皆上注於目為之精。精之窠為眼。骨之精為瞳子。（瞳子屬腎）筋之精為黑眼。（黑眼屬肝）血之精為絡。（眼中之絡屬心）氣之精為白眼。（眼白屬肺）肌肉之精為約束。（眼胞屬脾）故瞳子黑眼法於陰。（屬下焦肝腎）白眼赤脈法於陽也。（屬上焦心肺）此數言。五藏六府陰陽虛實寒熱標本皆在其中矣。若泥於五輪八廓。七十二問病。一百零八症。專於此科。徒亂心目。

余所輯十九方。眼胞痰核堅硬。以二陳化堅。椒瘡紅腫。以清脾涼血。厥陰風火。以疎風清肝。淚液過多。目乾抽痛。滋水養肝熄風。肝脾結鬱。眼胞痰核。疎肝化痰軟堅。漏睛瘡日久。填補肝腎。眼胞困毒。清脾涼膈。石疽堅硬。補托軟堅。疽後餘毒。清肝養陰。有風溫秋燥之辛涼。風熱氣分之清肺。肝火上鬱之涼肝。目胞浮腫運脾利濕。晝昏夜明。益氣升陽。治法皆遵成書。臨症自有把握。治外兼乎治內。專科貴乎兼科。所謂循規蹈矩。使人巧也。不但質之瘍科於內科。即專科亦有裨益。刀鍼手法。余少師承。不敢與聞耳。余聽鴻註

○耳瘍

賣山鮑　肝氣挾濕。右耳脹痛。以疎風勝濕治之

羚羊角　薄荷　鈎藤　連翹　滑石

刺蒺藜　荆芥　池菊　丹皮　竹葉

吳江管　虛陽上升。耳竅塞窒。時痛。是下虛上實。清竅不能流暢。

用滋補下焦。使陰火潛伏。

製首烏　白芍　女貞子　靈磁石　料豆皮

沙蒺藜　青黛　懷牛膝　石决明

覆方　加黨參　牡蠣　除石决明　青黛

周浦史　腎開竅於耳。心寄竅於耳。肝脈絡於耳。總賴腎水滋養。

耳得之而為聰。但年已七十矣。失聰不得為病。所患者。抽痛。未

免肝風內擾。上干清竅。今擬滋水柔肝。以安心神。

北沙參　青黛　茯神　蒺藜　白芍

洋青鉛　遠志　磁石　石決明　熟首烏

乍浦盧　眩暈耳鳴。水不制火之候。以育陰和肝法。

黨參　茯苓　白芍　龍齒　料豆　棗仁

遠志　磁石

青浦蕭　稚年耳漏。防成聾疾。

生洋參　料豆　元參　石斛　柤藥珠

夏枯草　川貝　生甘草

揚州項　腎水虛怯。木鬱生風。兩耳模糊聤脹。先以清輕洩降。緩

商鹹陰。

煨葛根　橘紅　青黛　石决明　半夏

刺蒺藜　磁石　鮮荷葉

常熟李　腎陰虧損。肝陽上擾。右耳乾痛。失聰。宜肝腎並治。

六味丸加　黑山梔　新會皮　池菊

膽草　鈎藤

崑山馮　耳聾聤脹。是腎陰不足。肝膽鬱熱上蒸。清少陽鬱熱兼以養陰爲主。

北沙參　懷牛膝　穞豆皮　花粉　沙苑

製首烏　左牡蠣　荷葉

蘇州邵　腎開竅於耳。膽絡亦附於耳。凡元虛失聰。治在腎臟。邪蒙閉竅。治在膽腑。乃一定之法也。今年逾六旬。脉形細數。屬腎陰已虧。膽火肝風。又復上蒙清竅。致顴痛耳聾。膿流不絕。成為聤耳。藥非苦寒能直降可效。治宜填補下元。滋水制木。徐圖見愈。

製首烏　鈎藤　遠志　懷牛膝　磁石

穭豆皮　茯神　荷蒂　潼沙苑

周莊錢　暮年耳痔。形如牛乳。觸之。則痛徹巔腦。係肝胃之火。上結而成。宜梔子清肝湯主之。

黑梔　白芍　丹皮　甘草　黃芩　歸身

川芎　柴胡　黃連　石膏

青蒲槐　耳痔有年。難期速愈。

青黛　白芍　蒺藜　磁石　山梔　穭豆

石決明　菖蒲　荷葉

覆方　耳痔。努出耳外。脹痛。破傷。猶恐失血。慎之。

生地　川斛　羚角　遠志炭　丹皮

茜草　元參　川貝

平陽湯　耳後縫間。皮色紅裂。時出黃水津津。名為旋耳瘡。此係

肝膽濕熱。擬輕清少陽。并滲脾土。

羚羊角　連翹　赤芍　青蒿　黃芩　池菊

丹皮　米仁　六一散　附穿粉散輕粉隔紙炒

炙甲片　鉛粉　元黄丹　共研細末香油調搽

太倉吳　耳根腫痛。連及頸項。脈弦數。此肝膽之火。擬平降之法。

佐以舒鬱。

柴胡　梔子　連翹　歸身　小香附　青皮

黄芩　元參　白芍　川鬱金　撫芎

南滙高　耳門赤腫。痛引牙床。屬上焦風熱。宜清胃辛涼散主之。

荆芥　薄荷　升麻　甘草　大力子　防風

池菊　白芷　桔梗　白蘆根

覆方　耳門痛勢稍緩。口乾脈細數。宗耳為腎之外候治之。

生地　元參　連翹　酒芩　麥冬　花粉

赤芍　黃連　麸炒枳殼

平湖王　耳內熱癢。出水屬肝、膽、風熱上壅。宜清輕涼散治之。

鮮薄荷　夏枯草　鈎藤　連翹　青菊葉

石決明　鮮荷葉　丹皮

陳墓張　耳鳴失聰。小便赤濇。此屬陰火妄動之候。宗內經腎氣通於耳。

六味加知柏肉桂

石牌秦　耳垂後焮赤。腫痛。狀如伏鼠。寒熱間發。此手足少陽二經風火搏結而成。名為耳根毒。擬仙方活命飲主之。

防風 赤芍 角針 甘草節 銀花 白芷

新會 花粉 炒甲片 連翹 土貝

覆方 耳根毒、起發易潰。本為順證。今腐脫新生。理應補益。擬香貝養榮湯主之。

黨參 熟地 白朮 茯苓 甘草節 歸身

白芍 川芎 新會 生香附 桔梗 川貝

紹興馮 脈弦、耳閤腫連耳輪。痛生寒熱。名為耳發。已經五六日。難以消散。姑擬托裏透膿法。

角針 甘草 青皮 黃蓍 白芷 桔梗

當歸 銀花

復方　耳發腫痛已減寒熱得解。病退之機。此處氣多血少。最難腐潰。今瘡頭孔眼不一。形如蜂房。膿亦易洩。乃順證也。當補益清毒兼治之。

黃耆　歸身　茯苓　玉竹　廣皮　甘草

白芍　銀花　石斛　生地

嘉定沈　耳後毒、失於托理。誤投寒涼。則毒不能外發。耳遂攻耳竅。膿串耳內。以致成漏。宜煎丸並進。可期全愈。

製首烏　女貞子　茯神　麥冬　北沙參

煅牡蠣　白芍　料豆　沙苑

再服十全大補丸

本城姜　風温上鬱。右耳聤脹。

薄荷　馬勃　桔梗　連翹　杏仁　通草

滸墅關陸　風木之鬱。耳脹欲閉。

羚羊片　夏枯草　苦丁茶　連翹　薄荷梗

黑山梔皮　生香附

高郵畢　氣閉耳鳴。

鮮薄荷　杏仁　廣皮　防已　苦丁茶

連翹　厚樸　木通

本城莊　暑熱上鬱耳聤作脹咳。嗽。當清氣分之熱。

白沙參　杏仁　連翹　竹葉　六一散

震澤呂　頭痛耳鳴歷經三載脉來弦數陰虧損肝陽上升兼之夢泄理宜潛鎮

蒺藜　牡蠣　青鉛　鈎藤　首烏　穭豆皮

川斛　蓮鬚

某　濕温長夏最多濕熱鬱蒸之氣由口鼻而入上焦先病漸佈中下河間所謂三焦病也治與風寒食積迥異仲景云濕家不可發汗汗之則痙濕本陰邪其中人也則傷陽汗則陽易泄越而邪留不解濕蒸熱鬱發現為黄熏蒸氣隧之間正如罨麯之比斯時病全在氣分連翹赤小豆湯可以奏效今經一月邪彌三焦自耳前後左腫及右癰瘍大發夫癰者壅也不惟氣滯血

亦阻塞蒸而為膿穀食不思既然肉消殆盡胃氣索然矣商治之法補則助壅清則垂脫前輩成法一無可遵因思濕熱穢濁結於頭面清竅議輕可去實之法選芳香氣味使胃無所苦或者壅過得宣少進漿粥便是進步經云從上病者治其上靈樞云上焦如霧非輕揚芳香之氣何以開之

青菊葉　荷葉邊　金銀花　象貝母

菉豆皮　馬兜鈴　連翹　射干

煎好露一宿臨服加金汁一小杯

某　耳內流膿昔人為之腎疳用六味丸加味治今用其法兼清少陽

六味丸加　桑螵蛸　黃菊花　山梔

石決明　桑葉　黃柏鹽水炒

猪骨髓芡實粥為丸

某　舌白咳嗽。耳脹。口乾。此燥熱上鬱。肺氣不宣使然。當用辛涼。宜薄滋味。

鮮荷葉　連翹殼　大杏仁　白沙參

川貝母　菉豆皮

某　先起咳嗽。繼而耳聤脹痛。延綿百日不愈。此體質陰虧。觸入風溫。未經清理。外因傷及陰分。少陽相火陡起。故入暮厥痛愈劇。當先清降。再議育陰。

苦丁茶　鮮菊葉　金銀花　生菉豆皮

川貝母　益元散　鮮荷葉邊

某　風温發熱左耳後腫痛。

乾荷葉　苦丁茶　馬勃　連翹　杏仁

黑梔皮

某　左耳聤痛舌白脈數體質陰虛挾受暑風上焦氣熱宜用辛

涼輕藥

鮮菊葉　苦丁茶　黑山梔　飛滑石

連翹　淡竹葉

某　暑熱上鬱。耳聤作脹。咳嗽。當清氣熱。

杏仁　連翹殼　淡竹葉　川貝　白沙參

六一散

症　頭痛耳聤脹目微赤少陽相火上鬱以辛涼清解上焦

連翹　羚羊角　薄荷梗　丹皮　牛蒡　桑葉

內經曰北方生寒在臟爲腎在竅爲耳南方赤色而通於心開竅於耳手少陽三焦之脈而交出足少陽之後上繫耳後直上出耳角其支從耳後入耳中足少陽膽之脈行手少陽之前交手少陽之後其支從耳後入耳中走耳前所以耳爲腎竅開竅於心二少陽皆會於耳心爲離火腎爲坎水三焦爲水火之道路肝膽爲風木之樞機二少陽合爲相火人爲一小天地火升

水降如日月之東升西沒周流不息也火亢賴水滋潤水沉藉火蒸動離中虛陽抱陰坎中滿陰抱陽也水火不得相離者也水火升降不調三焦水火道路秘塞氣機阻滯雲霧不收龍雷上騰於天少陽風從內煽遇火勢若燎原遇水勢如翻海故風之性助物為威耳鳴耳聹耳脹耳根毒等各症見矣耳之疾虛則治在心腎實則治於風火二言盡之矣今輯三十六方心腎風火俱備雖曰外科皆出內科手筆若能心領神會舉一反三臨症未尚無小補耶　余聽鴻註

○鼻瘍

崇明程　手太陰蘊熱致生鼻瘵理宜清肺

羚羊片 桔梗 桑白皮 甘草 黑山梔

石決明 黃芩 連翹殼 荊芥 白蒺藜

南潯宋 鼻瘜不利。按脈弦數。此肝陽擾肺。非小恙。最宜養性。

枇杷葉 桑葉 杏仁霜 通草 石決明

鈎藤尖 蘇子 桔梗 荷葉邊

覆方 鼻生旋螺。係屬肺熱。又增咳嗽氣逆。脈仍弦大。夏令伊邇。

須防咯血。

羚羊 蘇子 杏仁 馬兜鈴 瓜蔞仁

青鉛 橘皮 蘆根 枇杷葉 鮮竹茹

青浦葉 鼻為肺之外候。風溫客腦。則額痛。鼻淵兼之痰火氣逆。

姑擬養陰肅肺

北沙參　冬桑葉　辛夷　鈎藤　石決

白蒺藜　川石斛　料豆　枇杷葉

覆方　鼻流黃色。濁涕、有腥穢之氣。是腦熱未楚。仍從前法。但此症久延。必致虛弱、當以奇授藿香丸。煎服之。庶幾相須奏效。

羚角片　桑葉　辛夷　半夏曲　北沙參

生石決　石斛　蒺藜　枇杷葉　青荷葉

附　奇授藿香丸

鮮藿香八兩　研極細末、雄豬膽汁、和丸、如桐子大、每服三錢蒼耳子湯送下、

盧墟俞　鼻管掀腫兩傍色紫膿汁浸淫癢而不痛此為鼻𧏾瘡係風熱客於肺絡姑擬辛散治之

羚羊角　連翹　黃芩　生牡蠣　夏枯草

青荷葉　池菊　滑石　甘草

北圻莊　鼻痔形如榴子漸漸垂下窒塞孔中有碍氣息此乃肺經風熱鬱久而成宜辛夷散肺飲主之

辛夷　生地　知母　百合　煅石膏

黃芩　甘草　升麻　麥冬　枇杷葉

杭州金　右脈洪數面鼻起瘰色紫腫痛此屬肺經血熱致發肺風但來已久一時難得痊愈且與辛涼清解

荆芥　防風　蟬蛻　白蒺藜　桑葉

桔梗　甘草　黄芩　牛蒡子　杏仁

覆方　面鼻皮色稍淡。紅瘤依然。宗風淫於內。治以辛涼。

羚羊角　黄芩　生石決　連翹　枇杷葉

生山梔　甘草　白蒺藜　桔梗　天花粉

無錫楊　肺風由手太陰血熱上壅。發於面鼻。延及頸項。色赤而紫。熱盛入血且深。姑擬祛風涼血之法。

生首烏　秦艽　白蒺藜　花粉　桑葉

大料豆　甘草　細生地

覆方　肺風蔓延已定。色淡痛減。仿古人治風先治血。血行風自

熄之旨。

生地　桑葉　秦艽　川芎　花粉　當歸

黄芩　赤芍　白蒺藜

楓涇顧　肺風兼挾濕熱。治以涼滲。

製軍　白蒺藜　連翹　玉竹　甘草

苦參　石決明　山梔　黄芩

周莊王　面鼻花刺。係肺熱上薰。治宜清肅肺熱。

冬桑葉　黄芩　白蒺藜　桔梗　枇杷葉

地骨皮　山梔　石決明　連翹

覆方　粉刺搔破。結成白屑。形如黍米。宜枇杷清肺飲主之。

黨參　黃連　甘草　黃芩　枇杷葉

鮮鮮桑白皮

本城俞　咳嗽經時。脈躁。此係肝火射肺。鼻翅腐碎。并防咯血。

代赭石　蘇子　地骨皮　桑白皮

瓜蔞霜　桔梗　枇杷葉

川沙陳　虛熱上蒸。鼻淵已久。酷暑之令。難期速效。

北沙參　麥冬　花粉　桑皮

白蒺藜　玉竹　青鉛　料豆

褚墅闕　肝火刑金。鼻竅鬱熱。久防腐爛。治以瀉肝潤肺。庶幾見效。

枇杷葉　黃芩　山梔皮　花粉

石决明　桔梗　白蘆根　甘草

徽州儲　鼻屬肺竅又爲氣主鼻中起瘤防碍氣息古人云肺經濕熱上蒸於腦入鼻而生瘜肉猶如地得濕熱上生菌蕈也治以辛夷散主之

辛夷　白芷　防風　細辛　木通　升麻

藁本　川芎　甘草　茶葉

江　積瘀在絡動絡血逆今年六月初時令暴熱熱氣吸入首先犯肺氣逆血湧强降其血血凝皆屬呆滯而淸空熱氣仍蒙閉於頭髓空靈之所諸竅痺塞鼻窒瘜肉出納之氣都從口出顯

然肺氣鬱蒸致腦髓熱蒸脂液自下古稱爍物消物莫如火但清寒直泄中下清空之病仍然議以氣分輕揚無取外散專事內通醫工遇此法則每每忽而失察

連翹　牛蒡子　通草　桑葉　鮮荷葉汁

青菊花葉　臨服入生石膏末煎一沸

張會卿曰鼻病無他也非風寒外感則內火上炎耳外感治宜辛散內熱治宜清涼知斯二者治鼻大綱盡乎是矣此治內症之大概也惟治外科者亦不能出此範圍鼻關竅於肺五味絡入鼻藏於心肺心肺有病鼻為之不利也獨陽明位居中土脾熱者鼻先赤傷寒二日陽明受之陽明主肉俠鼻絡於口鼻為

肺瘕膽移熱於腦則辛頞鼻淵鼻淵者濁涕下而不止也相火司天歲衄鼻窒君火司天歲衄鼻窒肺之外症屬火者多風寒濕兼而有之肺屬金畏火肺主氣風寒濕壅滯氣機至於鼻疽、鼻痔、鼻瘜、鼻癰、堅硬難除者或風寒鬱結或喜食膏粱煿炙陽明化熱經絡壅塞而成陽明主肉故肉堅而不易化也屬陽明者多肺䘌瘡、酒皻鼻、赤鼻、粉刺、肺風或酒濕傷脾脾經蘊熱熏灼於肺屬脾肺者多腦漏一症其因有三或傷於風或傷於寒或傷於熱或肝膽之熱上移於腦傷於風者太陽隱痛其涕清傷於寒者額顱隱痛其涕濁傷於熱者其涕黃濁膩而臭穢者也亦有腦髓不固淋下無度精氣不足致成虛怯今錄之方雖曰

外症皆屬內因故治鼻須辨三因內因外因不內外因辨於指掌治鼻之法得矣

余聽鴻註